

AIDS-Sekretariatets flytning

Ansaret for AIDS-sekretariatet blev flyttet d. 29. januar 1996. AIDS-Sekretariatet hører midlertidigt direkte under Medicinaldirektøren. En afklaring af AIDS-Sekretariatets fremtidige tilhørsforhold kommer i forbindelse med forårets strukturændringer i Sundhedsstyrelsen.

Fysisk befinder AIDS-Sekretariatets medarbejdere sig på samme adresse som tidligere, og kan også træffes på de sædvanlige telefonnumre. AIDS-Sekretariatet beskæftiger sig nu udelukkende med oplysningsindsatsen vedr. HIV og AIDS. Spørgsmål og henvendelser af juridisk og medicinsk karakter om HIV og AIDS besvares af Sundhedsstyrelsens 4. afdeling.

Protease-hæmmere

Som omtalt i pressen har der været tre succesfulde forsøg med kombinationsbehandling hvori der indgår protease-hæmmere. Forsøgene har vist nogle af de seneste års mest imponerende resultater i behandlingen af HIV-smittede.

Iflg. AIDS-Alert no.3, 1996 indgik i to studier stofferne ritonavir, zidovudine og zalcitabine. Der deltog 21 patienter i kombinationsbehandlingen i en 6 måneders periode, og det viste sig, at deres mediane cd4-tal næsten steg til det dobbelte.

Mængden af virus i blodet hos deltagerne faldt gennemsnitligt med 99%. Deltagerne var aldrig tidligere blevet behandlet for HIV, og de havde alle et cd4-tal på under 250, før de deltog i forsøget.

Det andet forsøg med Ritonavir var opbygget som et placebo-forsøg. Det viste sig, at dødeligheden var markant lavere hos gruppen, der fik behandling med proteasehæmmeren Ritonavir end hos placebogruppen.

I et tredje forsøg blev stofferne AZT, lamivudine og indinavir, der er en anden proteasehæmmer, kombineret.

Dette forsøg viste et fald af HIV i blodet på 99% over en periode på 6 måneder.

Enkelte AIDS-patienter i Danmark bliver for øjeblikket behandlet med proteasehæmmere, men stofferne er for øjeblikket ikke generelt tilgængelige for danske HIV-smittede. Ifølge professor Jens Ole Nielsen, Hvidovre Hospital, varer det dog næppe længe før de første større grupper af danske HIV-smittede får tilbudt en af ovenstående typer kombinationsbehandling.

De hospitalsafdelinger, der behandler HIV-smittede i Danmark, arbejder i øjeblikket på at udarbejde fælles retningslinier for, hvem der skal tilbydes behandlingen. Retningslinierne er sandsynligvis udarbejdet i løbet af et par uger, oplyser Jens Ole Nielsen.

Klamydia-projektet

Sundhedsstyrelsens Klamydia-projekt fortsætter i 1996.

For at understøtte formidlingen af budskaberne i det materiale, der blev udsendt sidst på året i 1995, vil læge Bodil Nygård besøge forskellige institutioner i udvalgte amter. Sundhedsplejersker er målgruppe for indsatsen. Bodil Nygård vil anspore og inspirere til, hvordan seksualundervisning kan foregå. Samtidig opfordres og støttes sundhedsplejerskerne i at bruge hinanden og andre i sundheds- og undervisningssektoren som ressourcepersoner. Det langsigtede formål med forårets indsats er at indhente erfaringer, som kan formidles og bruges som inspiration andre steder i landet.

Stop worrying - start living

Torsdag d. 28. marts afholder de afrikanske foreninger Swahili F.C., LUO-UNION, "ENNONO NAMAKULU GA BUGANDA" og HIV-Danmark arrangementet "stop worrying - start living - with the danger of HIV & AIDS".

Arrangementet foregår i Nørre Allé Medborgerhus, Nørre Allé 7 (ved Sankt Hans Torv), kl. 19-02.

Udover premiere på Sundhedsstyrelsens video "Face the facts - people with HIV & AIDS need love" bliver der digtkonkurrence over temaet HIV & AIDS, optræden af dansegrupperne Igokolo og Makula, og Mombasa Bridge spiller Afrojazz. Sidst på aftenen er der mulighed for at danse til DJ's Prince Anil, Brown (Veve), Willi (Baby Love) og Sir Robert.

Sundhedsstyrelsen yder tilskud til arrangementet.

HIV-1 subtype E

Der er fortsat usikkerhed om type E's smittefarlighed. Derfor resumeres den eksisterende viden her ganske kort.

Virustype B er den mest almindelige virustype i Europa og Nordamerika. Både virustype E og B inficerer blodceller. I laboratorieforsøg er det vist, at type E kan inficere en speciel slags celler (Langerhanske celler), som findes umiddelbart under slimhinderne. Det er blevet tolket som et tegn på, at der for at overføre subtype B skal være direkte blodkontakt, hvorimod subtype E muligvis også overføres gennem slimhinderne.

Sandsynligvis har også andre faktorer betydning for type E's spredningsmønster, f.eks. hvornår en type er kommet til det pågældende land, om der er en udbredt prostitutions-industri m.m..

Ingen kan sætte præcise tal på en evt. øget smitterisiko,

hvilket også er uden betydning i.f.m. smittespredning: Smittevejene er fortsat seksuel kontakt og overførsel gennem blod. Derfor skal forebyggelsesindsatsen fortsat have det sigte, at få seksuelt aktive til at have en sikrere adfærd. Samtidig opfordres til at undgå direkte blodkontakt.

Kvinder og HIV/AIDS

Else Smith, overlæge på Statens Seruminstitut, har skrevet en ph.d.-afhandling om "Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, Sexual Behaviour and Ano-Genital Lesions in Danish Women".

I afhandlingen vises en stigende tendens for andelen af heteroseksuelt HIV-smittede. Flere kvinder end tidligere smittes således med HIV.

Seksuelt aktive kvinder defineres i afhandlingen, som kvinder med mere end 5 partnere pr. år. Der beskrives en sammenhæng mellem dette og at være under 25 år, at have haft sex med en biseksuel mand, og at have haft sex med en udlænding.

Blandt heteroseksuelle oplyste flere kvinder end mænd, at de havde erfaring med analt samleje. Særligt kvinder, som

havde haft sex med en partner, der tilhørte en af risikogrupperne, og specielt hvis manden var biseksuel, havde dyrket analsex. Samme gruppe af kvinder oplyste, at de havde haft risikoadfærd.

Iflg. afhandlingen er seksuel risikoadfærd altså fortrinsvis udbredt blandt unge kvinder, der dyrker sex med en partner, der har en større sandsynlighed for at være HIV-smittet end befolkningen som helhed. Der er derfor fortsat behov for at oplyse unge kvinder om HIV og AIDS med det sigte at påvirke til en sikrere seksualadfærd.

"Behandlingspjecen"


Hæftet "HIV og AIDS. HIV-infektionen, følgesygdomme og behandling" er blevet genoptrykt.

Som HIV-smittet kan der melde sig mange forskellige spørgsmål om forløbet af infektionen, herunder hvilke behandlingsmuligheder, der er for HIV-smittede og hvilke symptomer, man selv kan være opmærksom på. I hæftet gives der svar på nogle af spørgsmålene. Hæftet kan fås hos Statens Information, tlf.: 33 37 92 28.

AIDS-statistikken dækker samtlige AIDS-tilfælde siden 1980, mens HIV-meldesystemet kun omfatter dem, der har valgt at lade sig teste siden 1990. De nyeste tal er reelt større end angivet, da nogle tilfælde erfaringsmæssigt indberettes noget senere, end de opdages.

Anmeldte AIDS-tilfælde i Danmark

1980 - 29. Februar 1996. Antal i alt: 1859



Nyfundne HIV-positive

August 1990 - 29. Februar 1996

Antal i alt: 1797

